



RRS® HA CELLUTRIX



PRESENTACION

Caja de 6 viales/ 12 viales

INDICACIONES

Tratamientos mesocelúlicos
Flacidez de la piel en áreas con celulitis
Corrector de grasa local

RRS HA Cellutrix debe ser utilizado bajo condiciones asépticas apropiadas en una clínica autorizada sobre la piel sana y desinfectada.

FORMULACION:

Ha, no reticulado 0,5 mg/10 ml

Solución de Biorevitalización 175 mg /10 ml

8 antioxidantes: Vit C, Ácido Tri-ferúlico, Ácido Írbico, Isobenzofurano, -hederina, Hederasaponina C, Hederacolchisida E y F.

2 lipolíticos: Fucoxantina, Cafeína.

7 flavonoides: Cinarosina, Cinaratriosida, Quercetina, Kaempferol, Troxerutina, Rutina, Hesperidina.

8 oligoelementos: I, K, Br, Cl, Ca, Fe, Si, Mg.

3 vitaminas: Vitamina C, Vitamina A, Vitamina B2

8 saponinas: Ruscogenina, Neoruscogeina, -hederina, Hederasaponina C, Hederacolchisida E y F, Asiaticosida, Medecassoside.


3 triterpenos: Ácido Asiático, Ácido Medecásico, Ácido Succínico.

1 aminoácido: L-Carnitina.

2 AHAs: Ácido Máfico, Ácido Láctico.

2 polifenóles: Ácido Clorogénico, florogucinol

PROTOCOLO DE USO



Zona: Nalgas/ Parte posterior del muslo

Volumen medio/sesión: 10ml área/ Máximo 30 ml

Frecuencia: 1 sesión/semana – 1 protocolo = 4-6 promedio de sesiones

Número de sesiones recomendadas: Repetir protocolo 1-3 veces al año

Combinación con otros tratamientos de estética:

- RRS puede mejorar los resultados de otros tratamientos con dispositivos médicos anticelulíticos.
- Excellderm Pro después de inyecciones RRS: Acciones sinérgicas.

RECOMENDACIONES

Antes del tratamiento

Antes del tratamiento, el médico debe informar al paciente:

- Sobre indicaciones y efectos.
- Las posibilidades de efectos secundarios (dolor, rojez, equimosis, sensación de picadura e hinchazón, inflamación local, los cuales desaparecen normalmente en 24 horas).
- Realizar prueba de alergia.

Las pieles sensibles pueden beneficiarse de la aplicación de una crema anestésica antes del tratamiento.

Después del tratamiento

Evitar temperaturas extremas

Saunas – Hamman

Exposición directa al sol o UV

Desde el día siguiente el maquillaje puede ser usado

CONTRAINDICACIONES

Alergia a alguno de los ingredientes. Pacientes que presenten alguna alteración en la piel, dolencia, infecciones o secuelas de infección estreptocócica. Pacientes que tomen inmunodepresores, que estén sometiéndose a terapia cortical, con historial de enfermedad autoinmune, pacientes con diabetes descompensada, reumatismo articular agudo, angina repetitiva y endocarditis.

No existen estudios disponibles sobre el uso durante el embarazo o lactancia, o en el caso de tratamiento en niños o menores.

MÁS INFORMACIÓN EN RRS-INJECT.COM/MEDINET