



RRS® HA EYES



DESCRIPCION:

RRS® HA EYES

PRESENTACION

Ampollas con 1,5 ml, cajas con 12 ampollas
Contiene 10ml (0,35 Fl.oz)

FORMULACION:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| - Acido hialurónico no reticulado | 5,0 mg/ml |
| - Biorevitalización solución | 27,3 mg/ml |

La solución Biorrevitalizante contiene:

11 antioxidantes: Vitamina C, Naringin, Resveratrol, R-2 Viniferin, ε-Viniferin, Iso-ε-Viniferin, etc

5 Flavonoides: Troxerutin, Rutin, Naringin, Hesperidin Methyl Chalcone, Hesperidin

3 Saponinas: Ruscogenin, Neoruscogenin, Escin

5 polifenoles: R-2 Viniferin, ε-Viniferin, R-Viniferin, Iso-ε-Viniferin, Resveratrol, Coumarin

2 péptidos: Dipeptide VW, Peptide Pal-GQPR

1 Oligoelemento: Organic Silicium

INDICACIONES

Mejora la apariencia del contorno de ojos
Arrugas superficiales alrededor de los ojos
Ojeras y ojos que parecen cansados
Sin límite de edad

PROTOCOLO DE USO

Area: Ojos

Media de volumen/sesión: 0,65 ml/área- 1.25 ml ambos ojos


Tipo de inyección: Pápula micro dermal

Frecuencia: 1 sesión/2 semana – 1 protocolo =4 sesiones de media

Recomendado número de sesiones: Repetir el protocolo 1-3 veces al año

Combinación con otros tratamientos estéticos:

- RRS puede mejorar resultados de otros tratamientos y equipos médicos
- Toxina botulínica: dos semanas antes/después de la inyección RRS
- Equipo de microaguaja: Inyección RRS puede ser realizada inmediatamente antes
- Lasers: Inyecciones RRS pueden ser realizadas inmediatamente antes



(Distancia entre los puntos de inyección 0,5 cm)

PRECAUCIONES - CONTRAINDICACIONES

RRS HA EYES debe ser utilizado bajo condiciones asépticas apropiadas in una clínica autorizada, con la piel desinfectada.

- Antes del tratamiento

Antes del tratamiento, el profesional debe informar al paciente:

- Sobre indicaciones y efectos.
- Las posibilidades de efectos secundarios (dolor, rojez, equimosis, sensación de picadura e hinchazón, inflamación local, los cuales desaparecen normalmente en 24 horas).
- Realizar prueba de alergia.

Las pieles sensibles pueden beneficiarse de la aplicación de una crema anestésica antes del tratamiento. Recomendamos tener un consentimiento firmado por parte del paciente

Después del tratamiento

Evitar temperaturas extremas

Saunas – Hamman

Exposición directa al sol o UV

Desde el día siguiente el maquillaje puede ser usado

CONTRAINDICACIONES

Alergia a alguno de los ingredientes. Pacientes que presenten alguna alteración en la piel, dolencia, infecciones o secuelas de infección estreptocócica. Pacientes que tomen inmunodepresores, que estén sometiéndose a terapia cortical, con historial de enfermedad autoinmune, pacientes con diabetes descompensada, reumatismo articular agudo, angina repetitiva y endocarditis.

No existen estudios disponibles sobre el uso durante el embarazo o lactancia, o en el caso de tratamiento en niños o menores.

MÁS INFORMACIÓN EN RRS-INJECT.COM/MEDINET