



RRS® HA TENSOR LIFT



DESCRIPCION:
RRS® HA TENSOR LIFT

PRESENTACION

Viales con 5 ml, cajas con 6 viales
Contiene 5ml (0,175 Fl.oz)

INDICACIONES

Meso tratamiento Antiaging
Suave lifting de la piel
Estimulación del colágeno
Recomendado para pacientes de 35-55 años

FORMULACION:

- Sodium Hyaluronato 6 mg/ml
- Biorevitalizacion solución

La solución Biorrevitalizante contiene:

DMAE

11 vitaminas: vit C, Vit B1, vit B6, vit B12, vit B2, vit B9, vit B3, vit B5, vit A, vit E, vit F

21 aminoácidos: Taurine, Thiocctic Acid, Leucine, Valine, Levoglutamine, Alanine, Aspartic Acid, Glutamic Acid, Glycine, Histidine, Hydroxyproline, Isoleucine, Lysine, Methionine, Phenylalanine, Proline, Serine, Threonine, Tyrosine, Arginine Aspartate, Arginine.

20 antioxidantes: Acorbic Acid, Taurine, Phytic Acid, Tocopherol, Clhorogenic Acid, Gallic Acid, Ferulic Acid, Rosmarinic Acid, Resveratrol, etc

13 Oligoelementos: Ca, Cu, Cr, Co, Fe, K, Mg, Mn, Na, P, Se Zn, Si


2 ácidos grasos : Oleic acid, Linoleic acid

2 coenzimas: NAD, NADP

11 polifenoles: Quercetine, Hesperidine, Resveratrol, Catechine, Epicatechine, Procyanidin, R-2 Viniferin, Iso-ε-Viniferin, Rosmarinic Acid

5 terpenes: Linalool, Borneol, Limonene, 1,8-Cineol, Myrcene

PRINCIPAL PROTOCOLO ANTIAGING



Area: cara/cuello y escote

Media de volumen/sesión: 5 ml

Tipo de inyección: Pápula micro demal

Frecuencia: 1 sesión/semana – 1 protocolo =4-6 sesiones de media

Recomendado número de sesiones: Repetir el protocolo 1-3 veces al año

Combinación con otros tratamientos estéticos:

- Toxina botulínica: dos semanas antes de la inyección RRS
- Relleno: El tiempo no es importante. Puede ser inyectado en un tratamiento
- Peeling: La inyección de RRS puede ser hecha inmediatamente antes de usar peelings
- Equipo de microaguja: Inyección RRS puede ser realizada inmediatamente antes
- Láser: Inyección RRS puede ser realizada inmediatamente antes

RRS HA TENSOR LIFT debe ser utilizado bajo condiciones asépticas apropiadas en una clínica autorizada, con la piel desinfectada.

- Antes del tratamiento

Antes del tratamiento, el profesional debe informar al paciente:

- Sobre indicaciones y efectos.
- Las posibilidades de efectos secundarios (dolor, rojez, equimosis, sensación de picadura e hinchazón, inflamación local, los cuales desaparecen normalmente en 24 horas).
- Realizar prueba de alergia.

Las pieles sensibles pueden beneficiarse de la aplicación de una crema anestésica antes del tratamiento.

Recomendamos tener un consentimiento firmado por parte del paciente

Después del tratamiento

Evitar temperaturas extremas

Saunas – Hamman

Exposición directa al sol o UV

Desde el día siguiente el maquillaje puede ser usado

CONTRAINDICACIONES

Alergia a alguno de los ingredientes. Pacientes que presenten alguna alteración en la piel, dolencia, infecciones o secuelas de infección estreptocócica. Pacientes que tomen inmunodepresores, que estén sometidos a terapia cortical, con historial de enfermedad autoinmune, pacientes con diabetes descompensada, reumatismo articular agudo, angina repetitiva y endocarditis.

No existen estudios disponibles sobre el uso durante el embarazo o lactancia, o en el caso de tratamiento en niños o menores.

MÁS INFORMACIÓN EN RRS-INJECT.COM/MEDINET