

CATÁLOGO CASOS APTOS - ANTES Y DESPUÉS

COLECCIÓN DE
TRATAMIENTOS

APTOS



Catálogo Casos Antes y Después

Casos clínicos y fotos de
antes y después


Hilos y Métodos Aptos

APTOS CASOS CLÍNICOS

INTRODUCCIÓN	9
TRAYECTORÍA	9
MÉTODOS	10
RESULTADOS	11
EFFECTOS ADVERSOS	12
RECOMENDACIONES POST-TRATAMIENTO	12
MEDICINAS RECOMENDADAS	12
CONCLUSIÓN	13

Aphoto

CONOCE LA MANERA MÁS FÁCIL PARA GUARDAR FOTOS DE PACIENTES



CASOS CLÍNICOS APTOS Y FOTOS ANTES Y DESPUÉS

INTRODUCCIÓN

A medida que envejecemos, los efectos de la gravedad se hacen más imperceptibles en nuestro rostro. El tejido de soporte de las mejillas se debilita y empieza a descolgarse, la grasa facial se pierde, la línea de la mandíbula que solía ser firme y tensa forma papada en los bordes de la boca que se desplaza hacia el mentón, y la parte inferior de la cara y el cuello se descuelgan. Esta acción de descolgamiento o caída del tejido es considerada por los médicos como ptosis. Tradicionalmente, la tendencia a la flacidez llevaría a la mayoría de las personas a un cirujano estético en busca de un lifting facial; sin embargo, ahora existe un procedimiento menos invasivo que puede levantar, contornear y suspender los tejidos flácidos de la cara, el cuello y el cuerpo en aquellas personas que sólo necesitan un rejuvenecimiento pequeño o moderado.

TRAYECTORIA

El lifting de hilos es un procedimiento que consiste en elevar el tejido blando en varias partes de la cara y el cuerpo, utilizando hilos especialmente diseñados sin tener que realizar incisiones como en el clásico lifting facial.

Además de la elevación, los hilos mejoran el tono, la texturay el color. Si se toma la sutura y se cortan púas a lo largo de su longitud, podría actuar como una cuerda para sostener unas cejas, mejillas o papada caídas; y esto dio lugar al desarrollo y la creación de los hilos APTOS a finales de los años 90. Estos hilos con barbas han sido patentados y desarrollados. Otras formas de hilos, tanto con barbas como lisos para su uso en procedimientos de lifting con hilos. Los candidatos ideales para los hilos tensores son las personas con mínimos signos de envejecimiento que sólo necesitan un pequeño lifting. Normalmente, se trata de mujeres y hombres de entre 35 y 55 años.

Candidatos aptos para el procedimiento:

- Signos leves o moderados de ptosis de la piel
- Pérdida de volumen del tejido
- Desarrollo de líneas finas y arrugas
- Cejas caídas
- Aspecto relajado/caído de la parte media del rostro
- Estrechamientos de los labios
- Prominencia de la mandíbula
- Ligeras bolsas bajo los ojos o en el cuello
- Pacientes con alguna recaída de un procedimiento anterior como un lifting facial o de cuello
- Asimetría facial
- Deshidratación de la piel

Candidatos no aptos para el procedimiento:

- Los pacientes que tienen la piel excesivamente flácida a una edad avanzada mostrarán una mejora muy limitada
- Los pacientes que son obesos o tienen una piel muy pesada y rugosa también mostrarán una mejora menor. En estos pacientes, el lifting con hilos tensores puede combinarse con la liposucción

MÉTODOS

No se requiere ninguna preparación especial antes del tratamiento. Sin embargo, recomendamos al paciente que comente sus expectativas y pregunte al médico cualquier duda que pueda tener antes de empezar el tratamiento. Informar al médico de cualquier tratamiento que ya haya recibido y de los medicamentos que esté tomando actualmente. Evitar los medicamentos anti coagulantes y la vitamina E una semana antes y después del tratamiento.

La aplicación de los hilos APTOS debe ser realizada por un médico que haya recibido una formación específica. El procedimiento no es doloroso. El tratamiento se realiza con anestesia local. El procedimiento no deja cicatrices.

Los hilos APTOS pueden utilizarse para tratar diversas partes de la cara y el cuerpo:

- Contornos de la cara
- Línea de la mandíbula (papada)
- Mejillas y zona media de la cara
- Cejas
- Cuello
- Pechos
- Brazos
- Manos
- Abdomen
- Nalgas
- Interior de los muslos
- Rodillas

El procedimiento de 20 minutos:

- La aplicación de los hilos APTOS dura unos 20 minutos en la sala de tratamiento.
- La mayoría de los pacientes pueden reanudar su trabajo el mismo día después del procedimiento. Los pacientes que se someten a la aplicación de varios hilos pueden sufrir más molestias.
- El tratamiento se adaptará a sus preferencias y puede combinarse con otros procedimientos estéticos.

RESULTADOS**Ventajas del Lifting con hilos APTOS:**

- Doble acción: lifting y rejuvenecimiento
- Procedimiento mínimamente invasivo realizado con anestesia local
- Dura entre 15 y 20 minutos
- Resultados inmediatos
- Mínimo tiempo de inactividad
- Crecimiento de nuevo colágeno y aumento de la micro circulación
- Efecto a largo plazo (1,5-5 años dependiendo de la composición de los hilos)

Efectos Adversos

Como todos los procedimientos de este tipo, existe la posibilidad de que se produzcan efectos secundarios, aunque la frecuencia con la que se desarrolla cualquier tipo de efecto secundario es muy leve. Los posibles efectos secundarios son temporales y pueden incluir:

- Dolor
- Hinchazón
- Asimetría temporal
- Formación de ondulaciones u hoyuelos transitorios
- Hematoma o hematoma transitorio
- Ligera depresión o irregularidad de la piel

Las molestias deberían desaparecer unos días después del tratamiento.

Recomendaciones para después del tratamiento

- Aplicar paquetes de hielo inmediatamente después del procedimiento
- Tomar analgésicos en caso de dolor durante 2-3 días
- Abstenerse de maquillarse durante un mínimo de 24 horas
- Dormir boca arriba, en posición elevada sobre almohadas durante unas 3-5 noches
- Lavarse la cara suavemente sin frotar ni masajear durante 5-7 días
- Evitar los movimientos excesivos de la cara y el cuello durante unas 2 semanas
- Evitar los masajes en la cara y el cuello durante 1 mes
- Evitar la exposición excesiva a la luz solar directa durante 2 semanas
- Evitar el deporte y el ejercicio durante 2 semanas
- No utilice saunas durante unas 3 semanas
- Evitar la cirugía dental durante 3 semanas
- El médico le recetará un antibiótico si existe un riesgo importante de infección

MEDICINAS RECOMENDADAS:

- Para la hinchazón, aplique Traumeel gel, Troxevasin gel y otras cremas para la hinchazón, varias veces al día durante 1-2 semanas.

- Utilizar antisépticos (clorhexidina, miramistin, etc) para las zonas de intervención.
- Para el dolor, utilizar analgésicos, como ketonal, di-clofenaco, ibuprofeno, etc.
- Tomar antihistamínicos, como tavegil, klaritin u otros.
- Para la profilaxis de la infección, el médico puede recomendar antibióticos de amplio espectro durante 5 días.
- Si es necesario (dependiendo de las indicaciones) se recomienda llevar una venda elástica durante unas 2 semanas.
- Para acelerar la rehabilitación se recomienda la estimulación por microcorriente. Gracias a este procedimiento se puede mejorar rápidamente la estructura de la piel, haciéndola más elástica. Se recomienda iniciar la estimulación por microcorriente el segundo día después del lifting con hilos tensores.
- Si experimenta algún efecto secundario no mencionado anteriormente, como fiebre alta, aumento del dolor, enrojecimiento e hinchazón en la zona de la intervención u otras sensaciones desagradables y no naturales, póngase en contacto con su médico.

Conclusión

En comparación con el lifting facial tradicional, que deja cambios visibles y cicatrices bien ocultas pero claras y necesita un largo periodo de rehabilitación, el lifting con hilos APTOS no deja cicatrices ni altera las características originales del rostro. El efecto dura hasta 5 años, dependiendo del material de los hilos.

Para una mejor comprensión de todo lo anterior, a continuación puede encontrar estudios de casos de 36 pacientes.

Tercio Medio e Inferior

Dr. Francesco Sacco

Edad:
57

Sexo:
Femenino

Área Tratada:
Tercio Medio e Inferior de la cara

ANTES



DESPUÉS



Diagnóstico:

Ptosis media de los tejidos
de media cara

Hilos usados:

EVHA, 5 hilos por lado



CASOS CLÍNICOS APTOS

Tercio Superior

Dr. George Sulamanidze

Edad: 37 **Sexo:** Femenino **Área Tratada:** Tercio Superior de la cara

ANTES



DESPUÉS



Diagnóstico:

Ptosis de los tejidos blandos de la cara

Hilos usados:

- Light Lift Thread Method
- Light Lift Spring Method N
- Light Lift Needle Method
- Nano Vitis Method



País: Georgia

Tercio Superior

Dr. George Sulamanidze

Edad: 41 **Sexo:** Femenino **Área Tratada:** Tercio Superior de la cara

ANTES



DESPUÉS



Diagnóstico:

Ptosis de los tejidos blandos de la cara

Hilos usados:

- Light Lift Thread Method
- Light Lift Spring Method N
- Light Lift Needle Method
- Nano Vitis Method



País: Georgia

Tercio Medio e Inferior

Dr. Marlen Sulamanidze

Edad: 68 **Sexo:** Femenino **Área Tratada:** Línea de la mandíbula, líneas de la marioneta, cuello, zona de los pómulos

ANTES



DESPUÉS



Diagnóstico:

Ptosis de los tejidos blandos de la cara

Hilos usados:

- Light Lift Thread Method
- Light Lift Spring Method N
- Light Lift Needle Method
- Nano Vitis Method



País: Georgia

Tercio Medio e Inferior

Dr. Marlen Sulamanidze

Edad: 68 **Sexo:** Femenino **Área Tratada:** Línea de la mandíbula, líneas de la marioneta, cuello, zona de los pómulos

ANTES



DESPUÉS



Diagnóstico:

Ptosis de los tejidos blandos de la cara

Hilos usados:

- Light Lift Thread Method
- Light Lift Spring Method N
- Light Lift Needle Method
- Nano Vitis Method



País: Georgia

Tercio Medio e Inferior

Dr. Eric Essayagh

Edad: 65 **Sexo:** Femenino **Área Tratada:** Línea de la mandíbula, zona de los pómulos

ANTES



DESPUÉS



Diagnóstico:
Ptosis de los tejidos
blandos de la cara

Hilos usados:

- Visage Excellence Method Soft
- Light Lift Thread Method Soft



País: Francia

Tercio Medio e Inferior

Dr. George Sulamanidze

Edad: 53 **Sexo:** Femenino **Área Tratada:** Línea de la mandíbula, zona de los pómulos

ANTES



DESPUÉS



Diagnóstico:
Ptosis de los tejidos blandos del
tercio medio e inferior

Hilos usados:

- Visage Excellence Method Soft HA
- Light Lift Thread Method Blunt



País: Georgia

Tercio Medio e Inferior

Dr. George Sulamanidze

Edad: 57 **Sexo:** Femenino **Área Tratada:** Línea de la mandíbula, zona de los pómulos

ANTES



DESPUÉS



Diagnóstico:

Ptosis de los tejidos blandos del tercio medio e inferior

Hilos usados:

- Visage Excellence Method Soft HA
- Light Lift Thread Method Blunt



Tercio Medio e Inferior

Dr. George Sulamanidze

Edad: 57 **Sexo:** Femenino **Área Tratada:** Línea de la mandíbula, zona de los pómulos

ANTES



DESPUÉS



Diagnóstico:

Ptosis de los tejidos blandos del tercio medio e inferior

Hilos usados:

- Visage Excellence Method Soft HA
- Light Lift Thread Method Blunt

Tercio Medio e Inferior

Dr. George Sulamanidze

Edad: 57 **Sexo:** Femenino **Área Tratada:** Línea de la mandíbula, zona de los pómulos

ANTES



DESPUÉS



Diagnóstico:

Ptosis de los tejidos blandos del tercio medio e inferior

Hilos usados:

- Visage Excellence Method Soft HA
- Light Lift Thread Method Blunt



País: Georgia

Tercio Medio e Inferior

Dr. George Sulamanidze

Edad: 57 **Sexo:** Femenino **Área Tratada:** Línea de la mandíbula, zona de los pómulos

ANTES



DESPUÉS



Diagnóstico:

Ptosis de los tejidos blandos del tercio medio e inferior

Hilos usados:

- Visage Excellence Method Soft HA
- Light Lift Thread Method Blunt

País: Georgia

Tercio Medio e Inferior

Dr. Murat Tsintsadze

Edad: 42 **Sexo:** Masculino **Área Tratada:** Línea de la mandíbula, zona de los pómulos

ANTES



DESPUÉS



Diagnóstico:

Ptosis de los tejidos blandos del tercio medio e inferior

Hilos usados:

- Visage Excellence Method Soft
- Light Lift Thread Method



Tercio Medio e Inferior

Dr. Murat Tsintsadze

Edad: 40 **Sexo:** Femenino **Área Tratada:** Línea de la mandíbula, zona de los pómulos

ANTES



DESPUÉS



Diagnóstico:

Ptosis de los tejidos blandos del tercio medio e inferior

Hilos usados:

- Visage Excellence Method Soft



Tercio Medio e Inferior

Dr. Murat Tsintsadze

Edad: 42 **Sexo:** Masculino **Área Tratada:** Línea de la mandíbula, zona de los pómulos

ANTES



DESPUÉS



Diagnóstico:

Ptosis de los tejidos blandos del tercio medio e inferior

Hilos usados:

- Visage Excellence Method Soft
- Light Lift Thread Method



País: Georgia

Tercio Medio

Dr. Marlen Sulamanidze

Edad: 65 **Sexo:** Femenino **Área Tratada:** Zona auricular

ANTES



DESPUÉS



Diagnóstico:

Lóbulos de las orejas caídos después del lifting facial

Hilos usados:

- Light Lift Needle Method

País: Georgia

Tercio Medio e Inferior

Dr. Marlen Sulamanidze

Edad: 60 **Sexo:** Femenino **Área Tratada:** Área submental, Líneas de marioneta, Área mental

ANTES



DESPUÉS



Diagnóstico:

Ptosis de los tejidos blandos de la zona de la cara y el cuello

Hilos usados:

- Visage Excellence Method
- Light Lift Spring Method
- Light Lift Needle Method N



País: Georgia

Tercio Medio e Inferior

Dr. Marlen Sulamanidze

Edad: 44 **Sexo:** Femenino **Área Tratada:** Área mental, Líneas de marioneta

ANTES



DESPUÉS



Diagnóstico:

Ptosis de los tejidos blandos de la cara

Hilos usados:

- Light Lift Spring Method N
- Visage Excellence Method N



País: Georgia

Tercio Inferior

Dr. Ahmed Abdelaziz Mohamed

Edad: 25 **Sexo:** Femenino **Área Tratada:** Área mental

ANTES



DESPUÉS



Diagnóstico:
Pliegues nasolabiales
prominentes

Hilos usados:
• Visage Excellence Method HA



País: Egipto

Tercio Inferior

Dr. Ahmed Abdelaziz Mohamed

Edad: 25 **Sexo:** Femenino **Área Tratada:** Área mental

ANTES



DESPUÉS



Diagnóstico:
Pliegues nasolabiales
prominentes

Hilos usados:
• Visage Excellence Method HA



País: Egipto

Tercio Inferior

Dr. Ahmed Abdelaziz Mohamed

Edad: 48 **Sexo:** Femenino **Área Tratada:** Área mental, mandíbula

ANTES



DESPUÉS



Diagnóstico:

Pliegues nasolabiales prominentes, ptosis de los tejidos blandos del tercio medio e inferior

Hilos usados:

- Visage Excellence Method HA
- Light Lift Thread Method Blunt



Tercio Inferior

Dr. Ahmed Abdelaziz Mohamed

Edad: 48 **Sexo:** Femenino **Área Tratada:** Área mental, mandíbula

ANTES



DESPUÉS



Diagnóstico:

Pliegues nasolabiales prominentes, ptosis de los tejidos blandos del tercio medio e inferior

Hilos usados:

- Visage Excellence Method HA
- Light Lift Thread Method Blunt

Tercio Inferior

Dr. George Sulamanidze

Edad: 45 **Sexo:** Femenino **Área Tratada:** Área mental

ANTES



DESPUÉS



Diagnóstico:
Ptosis de los tejidos
blandos de la cara

Hilos usados:
• Visage Excellence Method HA



País: Georgia

Tercio Inferior

Dr. George Sulamanidze

Edad: 45 **Sexo:** Femenino **Área Tratada:** Área mental

ANTES



DESPUÉS



Diagnóstico:
Ptosis de los tejidos
blandos de la cara

Hilos usados:
• Visage Excellence Method HA



País: Georgia

Tercio Inferior

Dr. George Sulamanidze

Edad: 42 **Sexo:** Femenino **Área Tratada:** Área mental

ANTES



DESPUÉS



Diagnóstico:
Ptosis de los tejidos
blandos de la cara

Hilos usados:
• Visage Excellence Method HA



País: Georgia

Tercio Inferior

Dr. George Sulamanidze

Edad: 56 **Sexo:** Femenino **Área Tratada:** Área mental

ANTES



DESPUÉS



Diagnóstico:
Ptosis de los tejidos
blandos de la cara

Hilos usados:
• Visage Excellence Method HA



País: Georgia

Tercio Inferior

Dr. George Sulamanidze

Edad: 65 **Sexo:** Femenino **Área Tratada:** Área mental

ANTES



DESPUÉS



Diagnóstico:
Ptosis de los tejidos
blandos de la cara

Hilos usados:
• Visage Excellence Method HA



País: Georgia

Tercio Inferior

Dr. George Sulamanidze

Edad: 65 **Sexo:** Femenino **Área Tratada:** Área mental

ANTES



DESPUÉS



Diagnóstico:
Ptosis de los tejidos
blandos de la cara

Hilos usados:
• Visage Excellence Method HA

País: Georgia

Tercio Inferior

Dr. Monika Kavkova

Edad: 75 **Sexo:** Femenino **Área Tratada:** Área mental

ANTES



DESPUÉS



Diagnóstico:

Ptosis de los tejidos blandos de la cara

Hilos usados:

- Visage Excellence Method HA
- Otros:** 1,1cc Juvederm Ultra Smile labios +perioral, NLF



Tercio Inferior

Dr. Monika Kavkova

Edad: 75 **Sexo:** Femenino **Área Tratada:** Área mental

ANTES



DESPUÉS



Diagnóstico:

Ptosis de los tejidos blandos de la cara

Hilos usados:

- Visage Excellence Method HA
- Otros:** 1,1cc Juvederm Ultra Smile labios +perioral, NLF

Tercio Inferior

Dr. Monika Kavkova

Edad: 48 **Sexo:** Femenino **Área Tratada:** Área mental

ANTES



Diagnóstico:

Ptosis de los tejidos blandos de la cara

DESPUÉS



Hilos usados:

• Visage Excellence Method HA
Otros: 1,5 + Radiesse submalar, 1 cc Teosyal RHA 3 perioral, surco perimental



Tercio Inferior

Dr. Monika Kavkova

Edad: 48 **Sexo:** Femenino **Área Tratada:** Área mental

ANTES



Diagnóstico:

Ptosis de los tejidos blandos de la cara

DESPUÉS



Hilos usados:

• Visage Excellence Method HA
Otros: 1,5 + Radiesse submalar, 1 cc Teosyal RHA 3 perioral, surco perimental

Tercio Inferior

Dr. Monika Kavkova

Edad: 58 **Sexo:** Femenino **Área Tratada:** Área mental

ANTES



Diagnóstico:
Ptosis de los tejidos
blandos de la cara

DESPUÉS



Hilos usados:
• Visage Excellence Method HA
Otros: 1 cc Teosyal RHA 3 peri-
oral, surco perimental, surco
prejuvenil

Tercio Medio e Inferior

Dr. Marlen Sulamanidze

Edad: 57 **Sexo:** Femenino **Área Tratada:** Líneas de marioneta, línea de la mandíbula

ANTES



Diagnóstico:
Ptosis de los tejidos
blandos de la cara

DESPUÉS



Hilos usados:
• Light Lift Thread Method
• Light Lift Spring Method N

Tercio Medio e Inferior

Dr. Marlen Sulamanidze

Edad: 55 **Sexo:** Femenino **Área Tratada:** Zona submentoniana, línea de la mandíbula, zona de los pómulos

ANTES



DESPUÉS



Diagnóstico:

Ptosis de los tejidos blandos de la zona de la cara y el cuello y papada

Hilos usados:

- Light Lift Thread Method
- Light Lift Needle Method
- Light Lift Spring Method N
- Liposucción



País: Georgia

Tercio Inferior

Dr. Marlen Sulamanidze

Edad: 44 **Sexo:** Femenino **Área Tratada:** Área submental, Área mental

ANTES



DESPUÉS



Diagnóstico:

Ptosis de los tejidos blandos de la cara

Hilos usados:

- Light Lift Needle Method N
- Visage Excellence Method

País: Georgia

Tercio Inferior

Dr. Marlen Sulamanidze

Edad: 65 **Sexo:** Femenino **Área Tratada:** Área submental, Área mental

ANTES



DESPUÉS



Diagnóstico:

Ptosis de los tejidos blandos de la zona de la cara y el cuello y papada

Hilos usados:

- Visage Excellence Method
- Light Lift Needle Method N



País: Georgia

Tercio Inferior

Dr. Ahmed Abdelaziz Mohamed

Edad: 46 **Sexo:** Femenino **Área Tratada:** Área mental, mandíbula

ANTES



DESPUÉS



Diagnóstico:

Pliegues nasolabiales prominentes, ptosis de los tejidos blandos del tercio medio e inferior, grasa submentoniana

Hilos usados:

- Visage Excellence Method HA
- Light Lift Thread Method Blunt



País: Egipto

Tercio Medio e Inferior

Dr. Stiven Eli

Edad: 40 **Sexo:** Femenino **Área Tratada:** Línea de la mandíbula, zona de los pómulos, tercio medio de la cara, pliegue nasal

ANTES



DESPUÉS



Diagnóstico:

Ptosis de los tejidos blandos del tercio medio e inferior

Hilos usados:

- Visage Excellence Method
- Light Lift Needle Method

Tercio Inferior

Dr. Monika Kavkova

Edad: 38 **Sexo:** Femenino **Área Tratada:** Línea de la mandíbula

ANTES



DESPUÉS



Diagnóstico:

Ptosis del tercio inferior de los tejidos blandos

Hilos usados:

- Visage Excellence Method HA

Otros: 1 cc Juv Volux surco perimental, surco prefrontal, mentón

Tercio Medio e Inferior

Dr. Murat Tsintsadze

Edad: 65 **Sexo:** Femenino **Área Tratada:** Línea de la mandíbula, mitad de la cara

ANTES



DESPUÉS



Diagnóstico:

Ptosis de los tejidos blandos del tercio medio e inferior

Hilos usados:

- Visage Excellence Method
- Light Lift Linea Method



País: Georgia

Tercio Medio e Inferior

Dr. Murat Tsintsadze

Edad: 65 **Sexo:** Femenino **Área Tratada:** Línea de la mandíbula, mitad de la cara

ANTES



DESPUÉS



Diagnóstico:

Ptosis de los tejidos blandos del tercio medio e inferior

Hilos usados:

- Visage Excellence Method
- Light Lift Linea Method

País: Georgia

Tercio Medio e Inferior

Dr. Murat Tsintsadze

Edad: 40 **Sexo:** Masculino **Área Tratada:** Línea de la mandíbula, zona de los pómulos, tercio medio de la cara, pliegue nasal

ANTES



DESPUÉS



Diagnóstico:

Ptosis de los tejidos blandos del tercio medio e inferior, Pliegue nasal prominente

Hilos usados:

- Visage Excellence Method
- Light Lift Thread Method
- Nano Spring Method



País: Georgia

Tercio Medio e Inferior

Dr. Murat Tsintsadze

Edad: 40 **Sexo:** Masculino **Área Tratada:** Línea de la mandíbula, zona de los pómulos, tercio medio de la cara, pliegue nasal

ANTES



DESPUÉS



Diagnóstico:

Ptosis de los tejidos blandos del tercio medio e inferior, Pliegue nasal prominente

Hilos usados:

- Visage Excellence Method
- Light Lift Thread Method
- Nano Spring Method

País: Georgia

Tercio Medio e Inferior

Dr. Marlen Sulamanidze

Edad: 30 **Sexo:** Femenino **Área Tratada:** Mentón, cuello, área mental

ANTES



DESPUÉS



Diagnóstico:

Ptosis de los tejidos blandos de la zona de la cara y el cuello, Microgenia

Hilos usados:

- Visage Excellence Method
- Ligh Lift Needle Method
- Body Needle Method 4.0



País: Georgia

Tercio Inferior

Dr. George Sulamanidze

Edad: 44 **Sexo:** Femenino **Área Tratada:** Cuello y zona submentoniana

ANTES



DESPUÉS



Diagnóstico:

Doble mentón (grasa submental)

Hilos usados:

- Light Lift Needle Method Blunt



País: Georgia

Tercio Medio e Inferior

Dr. Monika Kavkova

Edad: 39 **Sexo:** Femenino **Área Tratada:** Área de los pómulos, área mental, área del cuello

ANTES



DESPUÉS



Diagnóstico:
Ptosis de los tejidos
blandos de la cara

Hilos usados:

- Visage Excellence Method HA
- Light Lift Needle Method



Tercio Medio e Inferior

Dr. Monika Kavkova

Edad: 39 **Sexo:** Femenino **Área Tratada:** Área de los pómulos, área mental, área del cuello

ANTES



DESPUÉS




Diagnóstico:
Ptosis de los tejidos
blandos de la cara

Hilos usados:

- Visage Excellence Method HA
- Light Lift Needle Method

Aphoto

MUESTRA LOS RESULTA DOS



HILOS Y MÉTODOS APTOS

APTOS - CASOS CLÍNICOS

HQ - Georgia

15 G. Amilakhvari str.
Tbilisi, Georgia.
+ 995 322 920371
hello@aptos.ge

Germany

Kurfürstendamm 194,
10707 Berlin.
+49 (0) 30 700 159 - 609
ekaterina.horn@aptos.global

Czech Republic

Balbinová 206/16
120 00 Prague.
+ 420 222 280 027
www.aptos.cz

